



TC1 Test 01/01/1952

Miralax AM- Instrucciones de preparación de la colonoscopia

Día de la Cita: (date) Hora de Llegada: (time)

Procedimiento realizado por: (provider)

Necesitará:

- 1 Botella de Miralax (Glycolax) 238 Gramos Polietilenglicol (PEG) disponible en la sección laxante de su pharmacy.
- Opcional para las personas con estreñimiento:
2 Dulcolax (Bisacodyl) laxante 5 mg tabletas también disponibles en la sección de laxantes de su farmacia.

Medicación especial y direcciones para diabéticos: vea instrucciones separadas

Una semana antes:

Deje de tomar pastillas de hierro, vitaminas o suplementos de hierbas en la forma de píldora.

Tome su medicamento de receta habitual durante la preparación a menos que se le diga que no. Aspirina, Ibuprofeno y Tylenol están bien si es necesario.

Evite los alimentos con semillas (semillas de lino, palomitas, frutos secos y bayas). Obstruyen el colonoscopia.

Dos días antes:

Dejar de tomar suplementos de fibra: Metamucil, Citrucel, etc.

Opcional: Si usted está generalmente estreñido, debe tomar 2 comprimidos de Dulcolax (5 mg) a la hora de acostarse en la noche.

24 horas antes de la colonoscopia: (Day before procedure)

Comience la dieta líquida clara. SIN ALIMENTOS SÓLIDOS

Usted puede tener: agua, café, té, (sin leche o cremas) zumos de frutas claras sin pulpa o nubosidad, soda, Gatorade, caldo de pollo, paletas y JELL-O.

Evite el color rojo en todos los líquidos. Evite el alcohol.

4:00 PM: Mezcle la botella de 238 gramos de Miralax con 64 onzas de Gatorade frío o jugo transparente en una jarra. Agitar la solución para mezclar bien.

Beba un vaso de 8 onzas cada 15 - 20 minutos hasta que la solución se ha ido.

Las náuseas y la plenitud son comunes hasta que el laxante empieza a funcionar. Si

vomita durante la preparación, espere 30 minutos, intente de nuevo y vaya más despacio.

Día de Colonoscopia: (Day of procedure)

Tome sus medicamentos regulares por la mañana al menos 4 horas antes de su cita. **NO ponga NADA en su boca las 2 horas antes de su procedimiento.** Esto incluye pero no se limita a: preparación intestinal, medicamentos, caramelos duros, goma de mascar y tabaco de mascar.

No comida. No Líquidos. 2 horas.

Si estas instrucciones no han sido seguidas, su cita puede ser demorada o cancelada.

Si recibió estas instrucciones por correo electrónico, también recibirá un archivo adjunto con información adicional importante.